

DANS LE TRAITEMENT SYMPTOMATIQUE DU SYNDROME DE L'ŒIL SEC

# FLUIDABAK

POVIDONE 1,5%

- EFFICACITÉ ET CONFORT
- COMME LES LARMES  
**FLUIDABAK** DE pH NEUTRE
- COMPATIBLE AVEC LE PORT  
DE LENTILLES DE CONTACT
- UNE UTILISATION LONGUE DURÉE  
DE 12 SEMAINES APRÈS OUVERTURE



## FLUIDABAK 1,5 %, collyre en solution

**COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE** : Povidone 1,500 g. Pour 100 ml. Excipients : Chlorure de sodium, phosphate disodique dodécahydraté, phosphate monosodique dihydraté, eau pour préparations injectables.

**FORME PHARMACEUTIQUE** : Collyre en solution. **DONNEES CLINIQUES** : **Indications thérapeutiques** :

**Traitement symptomatique du syndrome de l'œil sec.** **Posologie et mode d'administration** : Voie

locale. EN INSTILLATION OCULAIRE. **Posologie** : Instiller dans le cul de sac conjonctival inférieur, en tirant légèrement la paupière inférieure vers le bas et en regardant vers le haut, 1 goutte de collyre dans l'œil ou les yeux malades, 4 à 6 fois par jour, selon la gravité des symptômes. **Mode d'administration** : Le patient doit être informé : de se laver soigneusement les mains avant de procéder à l'instillation, d'éviter le contact de l'embout avec l'œil ou les paupières, de reboucher le flacon après utilisation. **Contre-indications** : Hypersensibilité à l'un des composants. **Mises en garde spéciales et précautions d'emploi** : En cas de traitement concomitant par un autre collyre, attendre 15 minutes entre les deux instillations.

**CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE** : Médicament non soumis à prescription médicale.

**TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ** : LABORATOIRES THEA, 12, RUE LOUIS BLERIOT, Z.I. DU BREZET, 63017 CLERMONT FERRAND CEDEX 2. Tél : 04.73.98.14.36.

**NUMERO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ** : 360 232-0 : 10 ml en flacon compte-gouttes.

**DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE** : 05. 03. 2013.