

DANS LE TRAITEMENT SYMPTOMATIQUE DU SYNDROME DE L'ŒIL SEC

FLUIDABAK

POVIDONE 1,5%

- EFFICACITÉ ET CONFORT
- COMPATIBLE AVEC LE PORT DE LENTILLES DE CONTACT
- COMME LES LARMES
FLUIDABAK DE pH NEUTRE
- UNE UTILISATION LONGUE DURÉE DE 12 SEMAINES APRÈS OUVERTURE



FLUIDABAK 1,5 %, collyre en solution

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE : Povidone 1,500 g. Pour 100 ml. Excipients : Chlorure de sodium, phosphate disodique dodécahydraté, phosphate monosodique dihydraté, eau pour préparations injectables.

FORME PHARMACEUTIQUE : Collyre en solution. **DONNEES CLINIQUES** : **Indications thérapeutiques** :

Traitement symptomatique du syndrome de l'œil sec. **Posologie et mode d'administration** : Voie

locale. EN INSTILLATION OCULAIRE. **Posologie** : Instiller dans le cul de sac conjonctival inférieur, en tirant légèrement la paupière inférieure vers le bas et en regardant vers le haut, 1 goutte de collyre dans l'œil ou les yeux malades, 4 à 6 fois par jour, selon la gravité des symptômes. **Mode d'administration** : Le patient doit être informé : de se laver soigneusement les mains avant de procéder à l'instillation, d'éviter le contact de l'embout avec l'œil ou les paupières, de reboucher le flacon après utilisation. **Contre-indications** : Hypersensibilité à l'un des composants. **Mises en garde spéciales et précautions d'emploi** : En cas de traitement concomitant par un autre collyre, attendre 15 minutes entre les deux instillations.

CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE : Médicament non soumis à prescription médicale.

TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ : LABORATOIRES THEA, 12, RUE LOUIS BLEROT, Z.I. DU BREZET, 63017 CLERMONT FERRAND CEDEX 2. Tél : 04.73.98.14.36.

NUMERO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ : 360 232-0 : 10 ml en flacon compte-gouttes.

DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE : 05. 03. 2013.